

VISIÓN EN TÚNEL:



Desaparecen de la visión todos los objetos y personas que están en la periferia.

Las causas son:

Glaucoma o retinosis pigmentaria.

¡ALERTA!

Póngase en alerta cuando se encuentre con la presencia de los siguientes síntomas o signos, en algún familiar, amigo, vecino o usted.

- Bebés con ojos grandes.
- Ojos rojos.
- Pupila de color blanco.
- Párpados muy caídos.
- Lagrimeo o parpadeo constante.
- Frecuentes dolores de cabeza.
- Tendencia a frotarse mucho los ojos.
- Ojos que no estén alineados (rectos).
- Secreción constante (lagañas).
- Pestañas que no estén presentes o mal orientadas.
- Cuando la córnea no es transparente y no permite ver el color del iris.
- Otros.

Ante estos síntomas, signos es importante consultar a un médico oftalmólogo.

RECUERDE:

Que un niño al nacer a medida que va creciendo, va desarrollando su visión hasta la edad de los 7 años; y si presenta un problema visual a edades tempranas, las funciones visuales no se desarrollan normalmente, lo cual le impedirá desenvolverse como cualquier otro niño.

La Fundación San Ignacio de Loyola (FUNDASIL) le ofrece la oportunidad por medio del Gabinete de Baja Visión; (médico oftalmólogo, estimulador visual, rehabilitador visual) brindarle la respectiva información de cómo acceder a los programas y tecnología existentes de baja visión.

CONSÚLTENOS:

(Secretaría FUNDASIL)

De lunes a viernes de horas 08:00 a 12:00 y de 14:20 a 18:20



63900272

Fundación San Ignacio de Loyola
Calle Junín 647, entre Ladislao Cabrera y Aroma,
a lado de la Federación de Campesinos
Teléfonos: 4797766 - 4068457 • Cel. 63900272



¡Estar donde otros no están!



DIFUSIÓN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN VISUAL

¿QUÉ ES LA DEFICIENCIA VISUAL?



No es en sí misma una enfermedad, es el resultado de una enfermedad, de un accidente o de ambos; en consecuencia la persona puede llegar a tener:

CEGUERA:

Es la imposibilidad o ausencia total de la visión.

BAJA VISIÓN:

Se considera una persona con baja visión, cuando presenta ciertas pérdidas de visión en ambos ojos. Es decir ve con mucha dificultad, haciendo uso de la visión del centro o los lados o ve borroso.

CAUSAS QUE PRODUCEN CEGUERA O BAJA VISIÓN:

- A. **Genéticas**
- B. Durante el embarazo
 - a. Desnutrición
 - b. Alcoholismo, drogadicción, tabaquismo
 - c. Suministro de algunos medicamentos
 - d. Radiaciones
 - e. Rubeola, Diabetes
 - f. Toxoplasmosis

g. Enfermedades transmisibles por contacto sexual.

C. Durante el nacimiento

a. Nacimiento prematuro

D. Después del nacimiento

- a. Accidentes
- b. Infecciones
- c. Quemaduras
- d. Meningitis, tumores, otros.

¿CÓMO DARME CUENTA SI TENGO BAJA VISIÓN?

VISIÓN BORROSA:

Es cuando aparecen las personas y objetos desenfocados.

Las causas son:

Degeneración macular, diabetes, patologías corneales o cataratas.



PERDIDA DE VISIÓN CENTRAL:



Es cuando aparece una mancha oscura o distorsión en el centro del ojo.

Las causas son:

Degeneración macular o atrofia del nervio óptico.

PÉRDIDA DE CONTRASTE Y DESLUMBRAMIENTO:

Los objetos y personas se confunden con el fondo, la luz resulta incómoda.

Las causas son:

Glaucoma, cataratas, patologías corneales, retinosis pigmentaria o albinismo.



PÉRDIDAS MÚLTIPLES DEL CAMPO VISUAL:

Se notan manchas oscuras alrededor de los objetos y personas.

Las causas son:

Diabetes, glaucoma, desprendimiento de retina o traumatismo.



DISTORSIÓN:

Las personas y objetos se ven deformados, curvados, ondulados o doblados.

Las causas son:

Degeneración macular, diabetes o desprendimiento de retina.

